


EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO SE PUEDE PREVENIR

Con pruebas de detección periódicas y vacunándose contra el VPH



En 2020 en los EEUU, se diagnosticarán cerca de 13.800 casos de cáncer de cuello uterino y ocurrirán cerca de 4.290 muertes.




La mayoría de los cánceres de cuello uterino son causados por una infección con ciertos tipos de virus del papiloma humano (VPH).



Vacunas para los tipos de VPH que causan el 90% de los cánceres de cuello uterino se recomiendan para niños y niñas de 11 a 12 años de edad.

Incidencia de cáncer de cuello uterino por raza/etnia, EEUU 2012-2017



Desigualdades en cáncer

- Las mujeres hispanas, las afroamericanas y las indígenas americanas /nativas de Alaska, tienen tasas más altas de cáncer de cuello uterino que las mujeres blancas no hispanas.
- Las tasas de mortalidad por la enfermedad son más altas entre las mujeres afroamericanas.

Las desigualdades en cáncer entre los grupos raciales y étnicos reflejan en gran parte la pobreza desproporcionada y la exposición a factores de riesgo ambientales.



En 2018, el 21% de los afroamericanos y el 18% de los hispanos vivían bajo línea de pobreza, comparados con 8% de los blancos no hispanos.

Miembros de los grupos raciales/étnicos carecen de servicios médicos y tienen menos probabilidad de recibir pruebas de detección de cáncer.




En 2018, el 18% de los hispanos y el 10% de los afroamericanos no tenían seguro de salud comparados con el 5% de los blancos no hispanos.

A dónde acudir para hacerse las pruebas de detección:

El Programa Nacional de Detección Temprana del Cáncer de Mama y de Cuello Uterino de CDC en los Estados Unidos, ofrece servicios para pruebas de detección y diagnóstico del cáncer de cuello uterino y de mama, a las mujeres con bajos ingresos, sin seguro médico, o con baja cobertura. Visite:

<https://www.cdc.gov/spanish/cancer/nbccedp/screenings.htm>



Fuentes: CDC, NCI, ACS.

Nuestras Voces Network

www.nuestrasvoces.org